

RENDSZERTAN

A papagájok a madarak osztályán belül a papagájalakúak rendjébe tartóznak! Erre a rendre jellemző a kampós csőr és a kúszólábak. A kampós csőr segítségével jó mászók! A Földön elterjedte

k, néhány fajuk már urbanizálódott, így akár Észak-Amerikában és Európában is találhatunk vad populációt, mégis ezek a madarak eredeti élőhelye a meleg, trópusi vagy száraz erdőségek, szavannák! A madarak mindenevők, sőt vannak fajok, melyek nehéz időkben akár vadásznak is, mégis ők elsősorban különböző növényi részeket fogyasztanak! A legtöbb faj különböző odvakban vagy sziklás üregekben költ, vannak viszont fajok, melyek maguk építik a fészket, mint pl.: a barátpapagáj.

A rendbe 3 család tartozik:

- papagájfélék - Psittacidae
- kakadufélék - Cacatuidae
- lórifélék - Loriidae

PAPAGÁJ-FÉLÉK

-

A papagájfélék családja talán a legnagyobb a papagájalakúak között, számtalan nem és faj tartozik ide!

Nesztorpapagáj-formák

A nesztorpapagáj-formák (Nestorinae) alcsaládjához egyetlen nem tartozik:

- **Nestor** - az egyetlen neme a nesztorpapagáj-formák alcsaládjának. Jellegzetességük a hosszú, elnyúlt kampós csőr, a olívaöldes/barna színezet, és a poligámia. A három idetartozó faj közül a kea fordul elő már tenyésztőknél, madárkézben, a másik kettő legfeljebb nagyobb papagájparkokban! A fajok mindegyike komolyan veszélyeztetett!!
 - **új-zélandi kaka** (Nestor meridionalis)
 - **kea** (Nestor notabilis) *
 - **norfolk-szigeti kaka** (Nestor productus) – kihalt

Bagolypapagájformák

Egyetlen idetartozó nem a Strigops.

- **Strigops** nembe egyetlen faj tartozik, a kakapo. Jellemző rájuk, hogy elsősorban magányosan élnek, a földön tartózkodnak, és sajnos végveszélyben vannak a behurcolt rágcsálók és az ember miatt, aki előszeretettel fogyasztotta húsukat! Ma már helyi tenyésztőprogramban tenyésztik őket, majd a fiatal egyedeket visszavádítják! Házikedvencként tartásuk nem megoldott!
 - **bagolypapagáj** más néven kakapó (Strigops habrotilus)*

Sörtésfejű papagájformák

A sörtésfejű papagájformák (Psittichadinae) alcsaládjához egyetlen nemzetség tartozik:

- **Psittichas** nembe egyetlen faj tartozik, mely mind küllemével mind érdekes életmódjával papagájkedvelők figyelmé rögtön rájuk terelődik! A madarak élelmezése fogságban nagyon nehéz, ami miatt csak néhány nagyobb papagájpark képes ezt a fajt tartani. Nagyon ritka!
 - **sörtefejű papagáj** (Psittichas fulgidus) *

Denevérpapagáj-formák

A denevérpapagáj-formák (Loriculinae) alcsaládjához egyetlen nem tartozik. Nevét arról kapták, mert pihenési pózban fejfelé csüngenek! Étkezésük hasonló a lóriékéhoz, nektárral, és gyümölcsökkel táplálkoznak! A madarak kicsik, rendszerint 14-16 cm-k. Fogságban még csak néhány faj ismert!

- **Loriculus**
 - malukui denevérpapagáj (*Loriculus amabilis*)
 - aranyhomlokú papagáj (*Loriculus aurantiifrons*)
 - bismarck-szigeti aranyhomlokú papagáj (*Loriculus tener*) egyes rendszerekben alfaj (*Loriculus aurantiifrons tener*)
 - Srí Lanka-i virágpapagáj (*Loriculus beryllinus*)
 - celebeszi denevérpapagáj (*Loriculus exilis*)
 - pirosfarcsíki denevérpapagáj (*Loriculus flosculus*)
 - kékfejű denevérpapagáj (*Loriculus galgulus*)
 - fülöp-szigeteki denevérpapagáj (*Loriculus philippensis*)
 - sárgatorokú denevérpapagáj (*Loriculus pusillus*)
 - pirosfejű denevérpapagáj (*Loriculus stigmatus*)
 - kéktorkú denevérpapagáj (*Loriculus vernalis*)
 - sangin-szigeti denevérpapagáj (*Loriculus catamene*)

Harkálypapagáj-formák

A harkálypapagáj-formák (Micropsittinae) alcsaládjához egyetlen nem tartozik:

- **Micropsitta**
 - örvös harkálypapagáj más néven vörösmellű Bruijn-papagáj (*Micropsitta bruijnii*)
 - Finsch-papagáj (*Micropsitta finschii*)
 - Schlegel-papagáj (*Micropsitta geelvinkiana*)
 - Salvador-papagáj (*Micropsitta keiensis*)
 - Meek-papagáj (*Micropsitta meeki*)
 - Sclater-harkálypapagáj más néven aranyarcú papagáj (*Micropsitta pusio*)

Valódi papagájformák

A valódi papagájformák (Psittacinae) alcsaládjához 6 élő nem tartozik, közülük fogságban elsősorban a *Poicephalus* nem és a *Psittacus* nem tagjai fordulnak elő gyakrabban, hébe hóba viszont a *Coracopsis* nem tagjai is, akiket elsősorban a tenyésztésprogram keretében tenyésztnek!

- **Cyclopsitta**
 - Reichenow narancsmellű törpepapagája (*Cyclopsitta guielmitertii*) más néven (*Oropsitta guielmitertii*)
 - aranyostestű álarcospapagáj (*Cyclopsitta diophthalma*) más néven (*Oropsitta diophthalma*)

- **Psittaculirostris**
 - Desmarest-papagáj (*Psittaculirostris desmarestii*)
 - Edwards-fügepapagáj (*Psittaculirostris edwardsii*)
 - aranyfülű papagáj más néven Salvador törpe ékszerpapagája (*Psittaculirostris salvadorii*)

- **Cyanoliseus**
 - üregi papagáj (*Cyanoliseus patagonus*)

- **Coracopsis**
 - kis vázapapagáj (*Coracopsis nigra*)
 - nagy vázapapagáj (*Coracopsis vasa*)

- **Psittacus**
 - jákópapagáj (*Psittacus erithacus*)

- **Poicephalus**
 - niami papagáj (*Poicephalus crassus*)
 - barnafejű papagáj (*Poicephalus cryptoxanthus*)
 - sárgahomlokú papagáj (*Poicephalus flavifrons*)
 - kongópapagáj (*Poicephalus guielmi*)
 - Meyer aranyosvállú papagája (*Poicephalus meyeri*)
 - fokföldi papagáj más néven barnafejű nagypapagáj (*Poicephalus robustus*) *
 - afrikai pirosahasú papagáj (*Poicephalus rufiventris*)
 - szenegálpapagáj (*Poicephalus senegalus*)
 - Rüppell kékfárú papagája más néven Angolai szürkepapagáj (*Poicephalus rueppellii*)

Laposfarkúpapagáj-formák

A laposfarkúpapagáj-formák (Platycercinae) alcsaládjához 11 nem tartozik. Meglehetősen elterjedtek, elsősorban Ausztráliában és a környező szigeteken fordulnak elő! Nevüket jellegzetes hosszú és lapos farkukról kapták! Számtalan faj ismert a fogságban és kedvelt voliermadarak!

- **Prosopeia**
 - sárgahasú álarcospapagáj vagy sárgahasú pézsmapapagáj (*Prosopeia personata*)
 - vöröshasú álarcospapagáj vagy fénylő pézsmapapagáj (*Prosopeia splendens*)
 - Pompadour-papagáj vagy gesztenyevörös pézsmapapagáj (*Prosopeia tabuensis*) *

- **Eunymphicus**
 - agancsos papagáj (*Eunymphicus cornutus*)

- **Cyanoramphus**
 - ugráló papagáj (*Cyanoramphus auriceps*)
 - norfolk-szigeti papagáj (*Cyanoramphus cookii*)
 - Mangere-kecskepapagáj vagy Forbes-ugráló papagáj (*Cyanoramphus forbesi*) régebben (*Cyanoramphus auriceps forbesi*)
 - narancshomlokú papagáj (*Cyanoramphus malherbi*)
 - Keckepapagáj (*Cyanoramphus novaezelandiae*)
 - új-kaledón kecskepapagáj (*Cyanoramphus saissetti*)
 - feketehomlokú kecskepapagáj (*Cyanoramphus ulietanus*) -kihalt
 - egyszínű papagáj (*Cyanoramphus unicolor*)
 - tahiti papagáj (*Cyanoramphus zealandicus*) -kihalt

- **Purpureicephalus**
 - vörössapkás papagáj (*Purpureicephalus spurius*)

- **Platycercus** 10 faj tartozik ide, meglehetősen kedvelt és ismert voliermadarak! Számtalan színváltozatokat tenyésztettek már ki! A madarak átlagosan 30-37 cm-k, nagyon agilis, mozgékony madarak. Más

fajokkal semmiképp ne tartsuk együtt, és egy volierben csak egy pár legyen, mert költési időszakban meglehetősen agresszívvé válnak!

- Adelaide papagáj (*Platycercus adelaidae*)
 - sápadtfejű rozellapapagáj (*Platycercus adscitus*)
 - Barnard-papagáj (*Platycercus barnardi*)
 - sárgahasú papagáj (*Platycercus caledonicus*)
 - Pennant-papagáj (*Platycercus elegans*)
 - rozellapapagáj (*Platycercus eximius*)
 - szalmapapagáj (*Platycercus flaveolus*)
 - Stanley-papagáj (*Platycercus icterotis*)
 - feketefejű rozellapapagáj (*Platycercus venustus*)
 - örvös rozellapapagáj (*Platycercus zonarius*)
-
- **Northiella**
 - vöröshasú papagáj (*Northiella haematogaster*)
-
- **Psephotus**
 - aranyosvállú papagáj (*Psephotus chrysopterygius*)
 - csuklyás papagáj (*Psephotus dissimilis*)
 - énekes papagáj (*Psephotus haematonotus*)
 - paradicsompapagáj (*Psephotus pulcherrimus*) kihalt
 - sokszínű papagáj (*Psephotus varius*)
-
- **Neopsephotus** nembe egyetlen faj tartozik ide. Fogságban meglehetősen kedvelt voliermadarak, természetük jó, csendesek. Számtalan színváltozatot tenyésztettek ki!
 - Bourk-papagáj vagy rózsásasú papagáj (*Neopsephotus bourkii*)
-
- **Neophema** Relatíván békés, nyugodt természetű madarak. Nagyságuk hullámpapagájéhoz hasonló, színpompásak, és relatívan igénytelenek, ami miatt kedvelt voliermadarak! A fajokat viszont külön tartsuk, mert más *Neophema*-fajokkal a madarak agresszívek lehetnek. Egyébként meg vegyesvolierben tarthatók!
 - aranyhasú papagáj (*Neophema chrysogaster*)
 - aranyosarcú papagáj (*Neophema chrysostoma*)
 - kékhomlokú papagáj (*Neophema elegans*)

- ausztráliai sziklapapagáj (*Neophema petrophila*)
- ékes papagáj (*Neophema pulchella*)
- fénypapagáj (*Neophema splendida*)

- **Lathamus** Fogságban még nem fordulnak elő olyan gyakran, pedig nagyon szép küllemű, értelmes madarak. Csoportban is tarthatók!
 - fecskepapagáj (*Lathamus discolor*)

- **Melopsittacus** A legismertebb papagáj a fogságban, már számtalan színváltozatukat tenyésztették ki, kedvelt voliermadarak! Tartásuk nem körülményes. Szabadban több ezer fős csapatokban élnek!
 - hullámos papagáj (*Melopsittacus undulatus*)

Földipapagáj-formák

A földipapagáj-formák (*Pezoporinae*) alcsaládjához 2 nem tartozik. Fogságban nem ismertek, relatívan veszélyeztetett madarak! Legfeljebb csak madárparkok rendelkeznek néhány példánnyal, melyeket tenyésztprogramok keretében tenyésztenek!

- **Pezoporus**
 - földi papagáj (*Pezoporus wallicus*)

- **Geopsittacus**
 - éjjeli papagáj (*Geopsittacus occidentalis*) vagy (*Pezoporus occidentalis*)

Nemespapagáj-formák

A nemespapagáj-formák (*Psittaculinae*) alcsaládjához 12 nem tartozik

- **Bolbopsittacus**
 - levágottfarkú papagáj (*Bolbopsittacus lunulatus*)

- **Psittinus** nembe egyetlen papagájfaj tartozik! A madár fogságban előfordul, noha meglehetősen ritka! A fogságban tartott példányokat tenyésztési program keretében tenyésztik!
 - vörösvállú papagáj (*Psittinus cyanurus*)

- **Psittacella**
 - Brehm-papagáj (*Psittacella brehmii*)
 - Madarász-papagáj (*Psittacella madaraszi*)
 - szerény papagáj (*Psittacella modesta*)
 - festett papagáj (*Psittacella picta*)

- **Geoffroyus**
 - pirosfejű Geoffroy-papagáj (*Geoffroyus geoffroyi*)
 - zöldfejű papagáj (*Geoffroyus simplex*)
 - aranyfejű papagáj (*Geoffroyus heteroclitus*)

- **Prioniturus**
 - kobalt madapapagáj más néven aranyzöld papagáj (*Prioniturus discurus*)
 - rakétafarkú papagáj (*Prioniturus flavicans*)
 - zöld madapapagáj (*Prioniturus luconensis*)
 - zászlós madapapagáj (*Prioniturus mada*)
 - hegyi zászlósfarkú papagáj (*Prioniturus montanus*)
 - zászlósfarkú motmot papagáj (*Prioniturus platurus*)
 - Waterstradt zászlósfarkú papagáj más néven mindanaói zászlósfarkú papagáj (*Prioniturus waterstradti*)
 - aranyló kobaltmadar (*Prioniturus platenae*)
 - sului rakétafarkú papagáj (*Prioniturus verticalis*)

- **Tanygnathus**
 - feketehomlokú edelpapagáj (*Tanygnathus gramineus*)
 - kéktarkójú edelpapagáj (*Tanygnathus lucionensis*)
 - éjszakai madapapagáj (*Tanygnathus sumatranus*)
 - nagycsőrű papagáj (*Tanygnathus megalorhynchus*)

- **Eclectus**
 - nemes papagáj (*Eclectus roratus*)

- **Alisterus**
 - Ambon-királypapagáj (*Alisterus amboinensis*)
 - zöldszárnýú királypapagáj (*Alisterus chloropterus*)
 - királypapagáj (*Alisterus scapularis*)

- **Aprosmictus**
 - Timor-pirosszárnýú papagáj (*Aprosmictus jonquillaceus*)
 - pirosszárnýú papagáj (*Aprosmictus erythropterus*)

- **Polytelis** nem tagjai fogságban elterjedt, kedvelt, színpompás voliermadarak! Relatíván békés fajok, hosszúk eléri a 37-45 cm-t.
 - hegyi papagáj (*Polytelis anthopeplus*)
 - kéksapkás papagáj más néven Walesi hercegnő-papagáj (*Polytelis alexandrae*)
 - sárgatorkú papagáj (*Polytelis swainsonii*)

- **Psittacula** nem tagjai többsége fogságban előfordul, kedvelt voliermadarak. Jellegzetességük a hosszú vékony farok. Elsősorban ázsiai fajok, de a kis sándorpapagáj számos más területeken is előfordul már! Elsősorban ismert fajok a kis és a nagy sándorpapagáj, a himalájai papagáj, a szilvafejű papagáj, a szakállas illetve a fenyőpapagáj. A fajokra jellemző a színpompás, kecsék megjelenés. Elterjedt fajoknak számos színváltozatuk létezik már!
 - himalájai papagáj (*Psittacula himalayana*)
 - kékfarkú himalája-edelpapagáj (*Psittacula finschii*)
 - fenyőpapagáj vagy kínapapagáj (*Psittacula derbiana*)
 - hosszúfarkú edelpapagáj (*Psittacula longicauda*)
 - kékszárnýú sándorpapagáj más néven smaragd sándorpapagáj (*Psittacula calthropae*)
 - mauritiusi sándorpapagáj (*Psittacula echo*)
 - nagy sándorpapagáj (*Psittacula eupatria*)
 - nicobari sándorpapagáj más néven szürkefejű sándorpapagáj (*Psittacula caniceps*)

- örvös sándorpapagáj más néven kis sándorpapagáj (*Psittacula krameri*)
 - rodriguezi sándorpapagáj (*Psittacula exsul*) -kihalt
 - seychelle-szigeteki sándorpapagáj más néven kékcárcú sándorpapagáj (*Psittacula wardi*) -kihalt
 - rózsásmellű szakállas papagáj (*Psittacula alexandri*)
 - galambpapagáj más néven Malabár-papagáj (*Psittacula columboides*)
 - rózsásfejű sándorpapagáj (*Psittacula roseata*)
 - szilvafejű papagáj más néven pelyhesfejű papagáj (*Psittacula cyanocephala*)
- **Agapornis** vagy másnéven a törpepapagájok kedvelt voliermadarak. A szerelmes madaraknak is szokták őket hívni, mivel párkapcsolatuk szoros, a párok folyton együtt bújnak, vakargatják egymást stb. A legtöbb faj fogságban előfordul, különböző intenzitással! Agilis, mozgékony madarak, erős hanggal. Más fajokkal ne tartsuk együtt, emellett a feketefejű törpepapagájon kívül gyakran a másik párokat is megtámadják! Számos színváltozatuk létezik már!
 - Fischer törpepapagája (*Agapornis fischeri*)
 - földieperfejű törpepapagáj más néven nyassza törpepapagáj (*Agapornis lilianae*)
 - rózsásfejű törpepapagáj (*Agapornis roseicollis*)
 - zöldfejű törpepapagáj (*Agapornis swindernianus*) más néven (*Agapornis swinderniana*)
 - hegyi törpepapagáj (*Agapornis taranta*)
 - szürkefejű törpepapagáj (*Agapornis canus*) más néven (*Agapornis cana*)
 - narancsfejű törpepapagáj (*Agapornis pullarius*)
 - álarcos törpepapagáj (*Agapornis personatus*)
 - kormosfejű törpepapagáj (*Agapornis nigrigenis*)

Újvilágipapagáj-formák

Az újvilágipapagáj-formák (*Arinae*) alcsaládjához 31 nem tartozik, minegyike Dél- és Közép-Amerikában őshonos!

- **Anodorhynchus** A fajok közül a jácintkék ara fordul elő fogságban, meglehetősen ritka fajoknak számítanak, ezért tenyésztésük keretében tenyésztésük kötelező!
 - tengerkék arara (*Anodorhynchus glaucus*) -kihalt
 - nagy jácintara más néven jácintkék ara (*Anodorhynchus hyacinthinus*)

- koboldkék Lear-ara (*Anodorhynchus leari*)

- **Cyanopsitta** nembe egyetlen faj tartozik, mely vadonban szinte már kihalt! Nagy tenéysztési és visszatelepítési munkálatok folynak a fajjal kapcsolatban, hogy azt fenntarthassák!
 - Spix-ara (*Cyanopsitta spixii*)

- **Ara** nembe a valódi arák tartóznak, meglehetősen ismert fajok, fogságban néhány faj gyakran fordul elő! Jellemző rájuk a csupasz pofafolt és a hosszú farktollak!
 - sárga-kék ara más néven közönséges arapapagáj (*Ara ararauna*)
 - kéktorkú ara (*Ara glaucogularis*)
 - kubai ara (*Ara tricolor*) -kihalt
 - kis katonaara (*Ara militaris*)
 - nagy katonaara (*Ara ambigua*)
 - sárgaszárnyú arakanga (*Ara macao*)
 - zölds szárnyú ara (*Ara chloropterus*) más néven (*Ara chloroptera*)
 - vörösfülű ara (*Ara rubrogenys*)
 - vörösszárnyélű ara (*Ara severa*)

- **Diopsittaca** Egy faj tartozik ide, egyes rendszerek az Ara nemhez sorolják.
 - kékhomlokú törpeara (*Diopsittaca nobilis*) más néven (*Ara nobilis*)

- **Primolius** 3 faj tartozik ide, egyes rendszerek az Ara nemhez sorolják
 - aranynyakú ara (*Primolius auricollis*) más néven (*Ara auricollis*)
 - hegyi ara (*Primolius couloni*) más néven (*Ara couloni*)
 - marakánaara (*Primolius maracana*) más néven (*Ara maracana*)

- **Orthopsittaca** Egy faj tartozik ide, egyes rendszerek az Ara nemhez sorolják
 - vöröshasú ara (*Orthopsittaca manilata*) más néven (*Ara manilata*)

- **Aratinga**



(c) by VALUE

ismert voliermadarak, meglehetősen színpompás, kíváncsi madarak, ám hátrányuk, hogy nagyon hangosak! Fogságban elsősorban az élénk színű madarak terjedtek el, mint a nappapagáj, és sajnos a zöld aratinák eléggé megfogyatkoztak, beszerzésük nehéz, mivel csak kevés tenyésztő tenyészt, mert nincs rájuk kereset, hiszen nem olyan színpompások, emellett nagyon hangosak!

- aranyhomlokú aratinga (*Aratinga aurea*)
- aranyosfejű aratinga (*Aratinga auricapilla*)
- kaktusz aratinga (*Aratinga cactorum*)
- narancshomlokú aratingapapagáj (*Aratinga canicularis*)
- haitii zöldszárnyú aratinga (*Aratinga chloroptera*)
- gvajakilpapagáj (*Aratinga erythrogastra*)
- vöröshomlokú ékfarkúpapagáj (*Aratinga finschi*)
- zöld ékfarkúpapagáj (*Aratinga holochlora*)
- Jandaya aratinga (*Aratinga jandaya*)
- jamaicai aratinga, Olivtorkú aratinga (*Aratinga nana*)
- barnaarcú aratinga (*Aratinga pertinax*)
- nappapagáj (*Aratinga solstitialis*)
- Wagler aratingája (*Aratinga wagleri*)
- pirosálarcos aratinga más néven püspöksüveges aratinga (*Aratinga mitrata*)
- kékhomlokú aratinga (*Aratinga acuticaudata*)
- nicaraguai zöld aratinga (*Aratinga strenua*)
- pávua aratinga (*Aratinga leucophthalmus*)
- kubai aratinga (*Aratinga euops*)
- barnafejű aratinga (*Aratinga weddellii*)
- *Aratinga pinto*

- **Guarouba**
 - aranypapagáj (*Guarouba guarouba*) más néven (*Aratinga guarouba*)

- **Nandayus**
 - nandaypapagáj (*Nandayus nenday*)

- **Leptosittaca**
 - Branicki papagája más néven aranyoskantárú ékfarkú papagáj (*Leptosittaca branickii*)

- **Ognorhynchus**
 - sárgafülű papagáj (*Ognorhynchus icterotis*)

- **Rhynchopsitta**
 - vastagszőrű papagáj (*Rhynchopsitta pachyrhyncha*)
 - barnafejű ararapapagáj (*Rhynchopsitta terrisi*) – egyes rendszerekben alfajként szerepel

- **Pyrrhura** nem tagjai közül csak néhány fordul elő fogságban, általában kis termetű (20-30 cm) színpompás, de harsány madarak! A fajok elsősorban Dél-Amerikában fordulnak elő!
 - fehérmellű papagáj (*Pyrrhura albipectus*)
 - díszesszárnyú papagáj (*Pyrrhura calliptera*)
 - pirosfülű papagáj (*Pyrrhura cruentata*)
 - bolíviai pirosfarkú papagáj (*Pyrrhura devillei*)
 - demerapapagáj (*Pyrrhura egregia*)
 - barnafülű papagáj (*Pyrrhura frontalis*)
 - Hoffmann papagája (*Pyrrhura hoffmanni*)
 - fehérfülű papagáj (*Pyrrhura leucotis*)
 - feketefarkú papagáj (*Pyrrhura melanura*)
 - zöldarcú vörösfarkú papagáj (*Pyrrhura molinae*)
 - gyöngyös papagáj (*Pyrrhura perlata*)
 - kékszárnyú vörösfarkú papagáj (*Pyrrhura picta*)
 - pirosfejű papagáj (*Pyrrhura rhodoccephala*)
 - feketesapkás zöldarcú papagáj (*Pyrrhura rupicola*)
 - Szent Márta-hegyi papagáj (*Pyrrhura viridicata*)

- piroshasú papagáj (*Pyrrhura rhodogaster*)
 - El Oró-i papagáj (*Pyrrhura orcesi*)
 - zöldpofájú vörösfülű papagáj (*Pyrrhura hoematotis*)
- **Enicognathus**
 - smaragdzöld papagáj (*Enicognathus ferrugineus*)
 - hosszúcsőrű papagáj (*Enicognathus leptorhynchus*)
- **Myiopsitta** egy faj tartozik ide, mely fogságban eléggé kedvelt, különböző színváltozatai léteznek már, és jellegzetessége, hogy saját maga építi a fészket! Kolóniaköltésre alkalmas faj!
 - barátpapagáj más néven remetepapagáj (*Myiopsitta monachus*)
- **Bolborhynchus** 4 faj tartozik ide, akik közül elsősorban a katalinpapagáj vált kedvelt voliermadárrá! Számos színváltozata létezik már és nagyon jó a természetel!
 - citrom aymarapapagáj (*Bolborhynchus aurifrons*) más néven (*Psilopsiagon aurifrons*)
 - piroshomlokú aymarapapagáj (*Bolborhynchus ferrugineifrons*)
 - Katalin-papagáj (*Bolborhynchus lineola*)
 - vastagcsőrű andokpapagáj (*Bolborhynchus orbynesius*)
- **Psilopsiagon** egy faj tartozik ide, fogságban előfordul, sajnos még nem nagyon elterjedt, noha nagyon jó természetű madárka! Mivel territóriális állat, egy volierben csak egy pár legyen! más fajokkal inkább ne tartsuk együtt!
 - aymara papagáj (*Psilopsiagon aymara*) más néven (*Bolborhynchus aymara*)
- **Forpus** vagy más néven a verébpapagájok közül csupán néhány faj ismertebb fogságban! Nagyon agilis madarak, 12-14 cm nagyságúak, rendszerint zöld színűek! A madarak nagyon agilisek, elhelyezésük

volierben történjen, és egy párat tenyésztés esetén egy volierbe rakjuk, külön a többitől! Más fajokkal ne tartsuk együtt! Ha nem tenyésztünk, megfelelően nagy volierbe több pár is lehet!

Nagyon szívós madarak, átlag életkoruk 20 év!



- kékszárnyú verébpapagáj (*Forpus cyanopygius*)
- zöldszárnyú verébpapagáj (*Forpus passerinus*)
- kékfarú verébpapagáj (*Forpus xanthopterygius*)
- szemgyűrűs verébpapagáj (*Forpus conspicillatus*)
- Sclater verébpapagája (*Forpus sclateri*)
- szürkehátú verébpapagáj (*Forpus coelestis*)
- sárga verébpapagáj (*Forpus xanthops*)

- **Nannopsittaca**
 - zöld tirika más néven tepui papagáj (*Nannopsittaca panychlora*)
 - amazonas-i papagáj (*Nannopsittaca dachilleae*)

- **Touit**
 - hétszínű papagáj (*Touit batavica*)
 - vöröskantárú papagáj (*Touit dilectissima*)
 - skarlátvállú papagáj (*Touit huetii*)
 - zafírfarkcsíkú papagáj (*Touit purpurata*)
 - foltosszárnyú papagáj (*Touit stictoptera*)
 - aranyfarkú papagáj (*Touit surda*) más néven (*Touit surda*)
 - *Touit costaricensis*
 - *Touit melanonotus*

- **Pionites** vagy másnéven fehérhasú papagájokhoz két faj tartozik! A feketesapkás elterjedt, kedvelt voliermadár, a rozsdásapkás viszont tenyésztésprogram keretében tenyésztésre szorul! A madarak szívósak, agilisek, és olyanok mint a koboldok! Átlagnagyságuk 23-25 cm.
 - rozsdásapkás papagáj (*Pionites leucogaster*)
 - feketesapkás papagáj (*Pionites melanocephalus*)

- **Gypsositta**
 - csupaszszemű papagáj (*Gypsositta vulturina*) más néven (*Pionopsitta vulturina*)

- **Hapalopsittaca**
 - feketeszárnyú papagáj (*Hapalopsittaca melanotis*)
 - rozsdásarcú papagáj (*Hapalopsittaca amazonina*)
 - indigószárnyú papagáj (*Hapalopsittaca fuertesi*)

- **Graydidascalus**
 - rövidfarkú papagáj (*Graydidascalus brachyurus*)

- **Deroptyus**
 - legyezőpapagáj (*Deroptyus accipitrinus*)

- **Triclaria**
 - malachitpapagáj (*Triclaria malachitacea*)*

- **Brotogeris** fogságban előfordulnak, tenyésztésre szoruló madarak! Természetük jó, tartásuk nem nehéz, tenyésztésük viszont körülményes!
 - aranyosszárnyú tirika (*Brotogeris chrysopterus*) más néven (*Brotogeris chrysoptera*)
 - kékszárnyú tirika (*Brotogeris cyanoptera*)
 - sárgaállú papagáj más néven aranyvállú papagáj (*Brotogeris jugularis*)
 - tűzszárnyú papagáj (*Brotogeris pyrrhopterus*)
 - tuipapagáj (*Brotogeris sanctithomae*)
 - tirikapapagáj (*Brotogeris tirica*)

- fehérszárnyú tirikapapagáj (*Brotogeris versicolurus*)
- kanáriszárnyú papagáj (*Brotogeris chiriri*)

- **Pionopsitta**
 - aranyarcú papagáj (*Pionopsitta barrabandi*)
 - sapkás papagáj (*Pionopsitta caica*)
 - vörösfülű papagáj (*Pionopsitta haematotis*)
 - skarlátfejű papagáj (*Pionopsitta pileata*)
 - rózsásarcú papagáj (*Pionopsitta pulchra*)
 - sáfrányfejű papagáj (*Pionopsitta pyralia*)

- **Pionus** vagy vörüösfarkú papagájok jellegzetessége, hogy farktolluk alatt kloákájuk környékén vörös folt van! A fogságban néhány fajuk kedvelt voliermadár, tartásuk nem nehéz, viszont a madarak többsége fogékony az aszergilózisra!
 - feketefülű papagáj (*Pionus menstruus*)
 - korallcsőrű papagáj (*Pionus sordidus*)
 - Maximilian papagája (*Pionus maximiliani*)
 - rózsafejű papagáj (*Pionus tumultuosus*)
 - fehérsapkás papagáj (*Pionus senilis*)
 - bronzszárnyú papagáj (*Pionus chalcopterus*)
 - ibolyapapagáj (*Pionus fuscus*)

- **Amazona** nem fajainak jellegzetessége, amiről nevüket is kapták, hogy elsősorban költési időszakban roppant agresszívvé válnak! Számos fajuk előfordul fogságban és kedvelt voliermadarak! Vannak fajok, mint a királyamazon vagy a sárgafejű amazon, melyek tenyésztési programok keretében tenyésztésre szorulnak!
 - kubai amazon (*Amazona leucocephala*)
 - jamaicai amazon (*Amazona collaria*)
 - kékkoronás amazon (*Amazona ventralis*)
 - Puerto Ricó-i amazon (*Amazona vittata*)
 - sárgakantáros amazon (*Amazona xantholora*)
 - fehérhomlokú amazon (*Amazona albifrons*)
 - pirostükrös amazon (*Amazona agilis*)
 - tucemáni amazon (*Amazona tucumana*)
 - díszes amazon (*Amazona pretrei*)
 - zöldarcú amazon (*Amazona viridigenalis*)
 - kéksapkás amazon (*Amazona finschi*)

- őszi amazon (*Amazona autumnalis*)
- granadai amazon (*Amazona dufresniana*)
- tűzeshomlokú amazon (*Amazona rhodocorytha*) egyes rendszerekben alfaj (*Amazona dufresniana rhodocorytha*)
- pirosfarkú amazon (*Amazona brasiliensis*)
- kékszakállas amazon (*Amazona festiva*)
- sárgavállú amazon (*Amazona barbadensis*)
- kékhomlokú amazon (*Amazona aestiva*)
- sárgafejű amazon (*Amazona oratrix*)
- sárgahomlokú amazon (*Amazona ochrocephala*)
- Sárgatarkójú amazon (*Amazona auropalliata*)
- Kawall amazonja (*Amazona kawalli*)
- venezuelai amazon (*Amazona amazonica*)
- katona amazon (*Amazona mercenaria*)
- Molnár-amazon (*Amazona farinosa*)
- galambnyakú amazon (*Amazona vinacea*)
- kékmászkos amazon (*Amazona versicolor*)
- kékfejű amazon (*Amazona arausiaca*)
- királyamazon (*Amazona guildingii*)
- császáramazon (*Amazona imperialis*)
- sárgahasú amazon (*Amazona xanthops*) vagy (*Salvatoria xanthops*)

KAKADUFÉLÉK

Fogságban talán az egyik legszebb papagájfélék egyike! Jellegzetességük az önállóan mozgatható, különböző színű és formájú bóbíta! A bóbítának szerepe van a testbeszédhez! A kakaduk tartása nehéz, a papagájtartás csúcsának számít, roppant szeszélyes madarak! Maga a kakadu szó maláj eredetű és csípőfogót jelent, ami hűen jellemzi erős csőrüket! Csípésük erős és maradandó sebet is okozhat!

Elterjedési területük elsősorban Ausztrália illetve Indonézia!

A kakaduk roppant érzékeny madarak, kicsi tartási hiba mellett is komoly problémák léphetnek fel, a legtöbb komoly problémás madár valamilyen kakaduféle. Fogságban tenyésztésük nem egyszerű, sajnos gyakran előfordul a kakaduk között a partnergyilkosság!

Fogságban meglehetősen sok kakadufaj fordul elő, ritkább fajokat elsősorban madárparkok tartják és tenyésztik!

Nem olyan színpompás madarak, elsősorban fekete, fehér, szürka illetve rózsaszín/lazacrózsaszín színben fordulnak elő!

Pálmakakaduformák

A pálmakakaduformák (Microglossinae) alcsaládjába 1 nem és 1 faj tartozik

- **Probosciger**
 - Pálmakakadu (*Probosciger aterrimus*) szokás arakakadunak is nevezni! Számtalan érdekes tulajdonságokkal rendelkezik, elsősorban madárparkok és komolyabb tenyésztők rendelkeznek ezzel a fajjal! Veszélyeztetettsége miatt tenyésztése tenyésztési programok keretében történik!

Hollókakaduformák

- **Callocephalon**
 - Sisakos kakadu (*Callocephalon fimbriatum*)
- **Nymphicus** nembe egyetlen egy faj tartozik, az ismert nimfapapagáj, mely fogságban nagyon kedvelt, kedves és problémamentes madár! számos színváltozata létezik már! Régebben átmenetnek tekintették a laposfarkúak között
 - Nimfapapagáj (*Nymphicus hollandicus*)
- **Calyptorhynchus**
 - Calyptorhynchus alnem, 2 faj
 - Pirosfarkú gyászkakadu (*Calyptorhynchus banksii*)
 - Barnafejű hollókakadu (*Calyptorhynchus lathami*)
 - Zanda alnem, 3 faj
 - Sárgafülű gyászkakadu (*Calyptorhynchus funereus*)
 - Fehérfülű gyászkakadu (*Calyptorhynchus baudinii*)
 - Fehérfarkú gyászkakadu (*Calyptorhynchus latirostris*)
- **Eolophus**

- Rózsás kakadu (*Eolophus roseicapillus*) vagy (*Cacatua roseicapilla*)

Valódi kakaduformák

A valódi kakaduformák (*Cacatuinae*) alcsaládjába 1 nem és 12 faj tartozik

- **Cacatua**
 - *Cacatua* alnem, 6 faj
 - Sárgabóbitás kakadu (*Cacatua galerita*)
 - Inkakakadu (*Cacatua leadbeateri*)
 - Aranyosarcú kakadu (*Cacatua sulphurea*)
 - Szemüveges kakadu (*Cacatua ophthalmica*)
 - Maluku-kakadu (*Cacatua moluccensis*)
 - Fehérbóbitás kakadu (*Cacatua alba*)
 - *Licmetis* alnem, 6 faj
 - Ormányos kakadu (*Cacatua tenuirostris*)
 - Pastinator-kakadu (*Cacatua pastinator*)
 - Csupaszszemű kakadu (*Cacatua sanguinea*)
 - Vörösfarú kakadu vagy pirosfarú kakadu (*Cacatua haematuropygia*)
 - Goffin-kakadu (*Cacatua goffini*)
 - Salamon-szigeteki kakadu (*Cacatua ducorpsii*)

LÓRIFÉLÉK

Színpompás, nagyon kíváncsi kis koboldok, akik kisebb-nagyobb csoportokban Ausztráliában és a környező szigeteken élnek! Nektárral és más növényi részekkel táplálkoznak! Táplálkozásuk miatt ürülékük meglehetősen hig, emiatt lakásban tartásuk nem feltétlenül ajánlott! Nagyon lármás madarak. Fogságban néhány faj kivételével atöbbi faj inkább csak ritkán fordul elő, legismertebb lórifaj, a szivárványlóri, melynek már számos színváltozata létezik!

- **Chalcopsitta**
 - barna lóri (*Chalcopsitta duivenbodei*)
 - fekete lóri vagy gyászlóri (*Chalcopsitta atra*)
 - kardinálslóri (*Chalcopsitta cardinalis*)

- csillámló lóri (*Chalcopsitta sintillata*)

- **Eos**
 - vörös lóri (*Eos bornea*)
 - kékfülű lóri (*Eos cyanogenia*)
 - kékálarcos lóri (*Eos semilarvata*)
 - csuklyás lóri (*Eos squamata*)
 - gyémántlori (*Eos histrio*)
 - csíkos lóri (*Eos reticulata*)

- **Pseudeos**
 - fehérfarcsíku lóri (*Pseudeos fuscata*)

- **Trichoglossus**
 - pikkelyes lóri (*Trichoglossus chlorolepidotus*)
 - sárgafejű lóri (*Trichoglossus euteles*)
 - sárga-zöld lóri vagy Meyer-lóri (*Trichoglossus flavoviridis*)
 - szivárványlori vagy sokszínű lóri (*Trichoglossus haematodus*)
 - vöröshasú lóri (*Trichoglossus rubritorquis*), egyes rendszerekben (*Trichoglossus haematodus*) *rubritorquis*) alfaj
 - meggyszínű lóri (*Trichoglossus rubiginosus*)
 - apo-hegyi asszonylori vagy Johnston asszonylórija (*Trichoglossus johnstoniae*)
 - ékes lóri (*Trichoglossus ornatus*)

- **Psitteuteles**
 - tarka lóri (*Psitteuteles versicolor*) vagy (*Trichoglossus versicolor*)
 - íriszlóri (*Psitteuteles iris*) vagy (*Trichoglossus iris*)
 - Goldie-lóri (*Psitteuteles goldiei*) vagy (*Trichoglossus goldiei*)

- **Lorius**
 - fehérnyakú lóri (*Lorius albidinuchus*) vagy (*Lorius albidinucha*)
 - Stresemann lórija vagy új-britanniai lóri (*Lorius amabilis*) vagy (*Lorius hypoinochrous*)
 - zöldfarkú lóri (*Lorius chlorocercus*)
 - sárgaköpenyes lóri (*Lorius garrulus*)

- vöröstarkójú hölgylóri (*Lorius lory*)
- feketefejú lóri (*Lorius domicella*) vagy (*Lorius domicellus*)

- **Phigys**
 - remetelóri (*Phigys solitarius*)

- **Vini**
 - kéksapkás lóri vagy kékfejű lóri (*Vini australis*)
 - rubinlóri (*Vini kuhlii*)
 - henders-szigeti lóri (*Vini stepheni*)
 - zafírlóri (*Vini peruviana*)
 - smaragd lóri (*Vini ultramarina*)

- **Glossopsitta**
 - mósuszlóri vagy pézsmalóri (*Glossopsitta concinna*)
 - kis mósuszlóri vagy kis pézsmalóri (*Glossopsitta pusilla*)
 - kékvállú lóri (*Glossopsitta porphyrocephala*)

- **Charmosyna**
 - aranycsíkos lóri (*Charmosyna pulchella*) vagy (*Glossopsitta pulchella*)
 - burulóri (*Charmosyna toxopei*) vagy (*Glossopsitta toxopei*)
 - pálmalóri (*Charmosyna palmarum*) vagy (*Glossopsitta palmarum*)
 - diadémlóri vagy kaledóniai lóri (*Charmosyna diadema*) vagy (*Glossopsitta diadema*) – kihalt
 - csíkozott lóri (*Charmosyna multistriata*) vagy (*Glossopsitta multistriata*)
 - Josephina-lóri (*Charmosyna josefinae*) vagy (*Glossopsitta josefinae*)
 - királyilóri vagy margarétaalóri (*Charmosyna margarethae*) vagy (*Glossopsitta margarethae*)
 - pápualóri vagy nyársfarkú lóri (*Charmosyna papou*)
 - pirostorkú lóri (*Charmosyna amabilis*) vagy (*Glossopsitta amabilis*)
 - pirosszárnyú lilafülű lóri (*Charmosyna rubronotata*) vagy (*Glossopsitta rubronotata*)
 - szép lóri (*Charmosyna placentis*) vagy (*Glossopsitta placentis*)
 - vöröstorkú lóri (*Charmosyna rubrigularis*) vagy (*Glossopsitta rubrigularis*)
 - zöld karmazsinlóri (*Charmosyna meeki*) vagy (*Glossopsitta meeki*)

- Wilhelmina-lóri (*Charmosyna wilhelminae*) vagy (*Glossopsitta wilhelminae*)

- **Oreopsittacus**
 - arfaki hegyi lóri (*Oreopsittacus arfaki*)

- **Neopsittacus**
 - Musschenbroek gualórija (*Neopsittacus musschenbroekii*)
 - Hartert-féle gualóri (*Neopsittacus pullicauda*)